

Beslutsstöd för val av skyddsutrustning vid hög risk för, eller bekräftad covid-19

Skyddsutrustning	Prata med patient (Närmare än 2 m)	Vårdåtgärd utan risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. kontroll vitalparametrar)	Vårdåtgärd med risk för kontakt med kroppsvätskor (t.ex. ta blodprov, tömma KAD-påse, lägesändring)	Vårdåtgärd hos patient med omfattande omvårdnadsbehov eller uttalade luftvägssymtom	Vårdåtgärder med risk för smittsam aerosolbildning (t.ex. HLR, CPAP, högflödesgrimpa, trakeostomivård)
Basala hygienrutiner	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓
Plastförkläde utan ärm	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	JA ✓ / NEJ ✗ **	JA ✓ / NEJ ✗ **
Plastförkläde med lång ärm	NEJ ✗	NEJ ✗	NEJ ✗	JA ✓ / NEJ ✗ **	JA ✓ / NEJ ✗ **
Visir eller skyddsglasögon	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓
Munskydd	JA ✓	JA ✓	JA ✓	JA ✓ / NEJ ✗ *	NEJ ✗
Andningsskydd FFP2/FFP3	NEJ ✗ *	NEJ ✗ *	NEJ ✗ *	JA ✓ / NEJ ✗ *	JA ✓
Handskar	NEJ ✗	NEJ ✗	JA ✓	JA ✓	JA ✓

*Andningsskydd ska användas under de 7 första dygnet från symtomdebut vid bekräftad covid-19 vid sammanlagd vårdtid >1 timma/ dag.

** Vårdsammanhanget avgör, rådgör med Vårdhygien om bästa valet på din enhet.

